



Návod k použití:

Plodina	Aplikace	Dávkování Lignohumátu
Ovocné stromy a keře (jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, slívy, angrešt, rybíz a ostatní ovoce)	máčení kořenového systému po dobu 2–3 hodin před výsadbou	50 ml /10 litrů vody; použitý roztok 2 – 4× naředit a použít na závlivku
	závlivka po přesazení a poté 1 až 2× během vegetačního období, doporučuje se společně s minerálními hnojivy	20 ml /10 litrů vody, 5 litrů roztoku ke každé rostlině
	postřik na list během vegetačního období 1 až 2× na jaře před květem	20 ml /10 litrů vody
	postřik na list během vegetačního období společně s fungicidy či insekticidy	20 ml /10 litrů pracovního roztoku
Zelenina (paprika, okurka, rajče, lilek, petržel, ředkvička atd.)	závlivka po výsevu	20 ml /10 litrů vody, 1 litr roztoku na 1m ²
	pravidelný postřik na list během vegetačního období v intervalu 10 – 14 dní	20 ml /10 litrů vody
	postřik společně s minerálními hnojivy, mikroelementy či fungicidy	10 ml /10 litrů pracovního roztoku
	kapková závlaha – samostatně nebo společně s výživou v intervalu 7 – 14 dní	100 ml /100 litrů pracovního roztoku
Jahody	máčení kořenového systému před sázením po dobu 2 – 4 hodin	50 ml /10 litrů vody; použitý roztok 2 – 4× naředit a použít na závlivku
	závlivka po vysazení	20 ml /10 litrů vody, 1 litr roztoku na 1m ²
	aplikace na list dva týdny před tvorbou pupat	20 ml /10 litrů vody
	aplikace na list během tvorby pupat	
	2 společně podzimní aplikace s přihnojením	20 ml /10 litrů pracovního roztoku
Brambory	moření hlíz po dobu 2 – 3 hodin před výsadbou	50 ml /10 litrů vody; použitý roztok 2 – 4× naředit a použít na závlivku
	postřik ve výšce rostlin 10 – 12 cm	20 ml /10 litrů vody
	postřik na list před květem	

Plodina	Aplikace	Dávkování Lignohumátu
Česnek	moření stroužků před sázením po dobu 2–3 hodin	1 ml /0,1 litru vody; použitý roztok 4 – 6× naředit a použít na závluku
	závluka během vegetace 1× za 10–14 dní	20 ml /10 litrů vody, 1 litr roztoku na 1m ²
Cibule	závluka po výsadbě a poté 1 až 2× během vegetačního období	20 ml /10 litrů vody
Réva vinná	máčení kořenového systému před výsadbou vinohradu po dobu 3–4 hodin	0,1 litru/10 litrů vody
	2–3 listové aplikace v době do kvetení, možno společně s výživou či mikroelementy	0,75–1,5 l/ha
	kdykoli během vegetace společně s fungicidy	0,5l/ha
Okrasné stromy a keře	máčení kořenového systému před výsadbou po dobu 2–4 hodin	50 ml /10 litrů vody; použitý roztok 2–4× naředit a použít na závluku
	závluka po přesazení a poté 1–2× během vegetačního období, možno i společně s minerálními hnojivy	20 ml /10 litrů vody, 5 litrů roztoku ke každé rostlině
	postřik na list v případě výskytu stresových faktorů (kolísání teplot, sucho, přemokření atd.)	20 ml /10 litrů vody
Pokořové rostliny	závluka během vegetace 1× za 10–14 dní, vhodné v kombinaci s minerálním hnojivem	20 ml /10 litrů vody
Cibulnaté a hlíznaté květiny (šafrán, jirčina, kosatec, lilie, modřeneč, narcis, tulipán ...)	máčení cibulí nebo kořenového systému po dobu 2–3 hodin před výsadbou	50 ml /10 litrů vody; použitý roztok 2–4× naředit a použít na závluku
	pravidelný postřik na list během vegetace v intervalu 10–14 dní	20 ml /10 litrů vody
Trávníky	závluka po založení trávníku	50 ml /10 litrů vody, 2 litry roztoku na 1m ²
	2× jarní postřik a 2× podzimní postřik v intervalu 14 dní	20 – 30 ml /10 litrů vody, 2 litry roztoku na 1m ²
Skalničky	závluka po přesazení na nové stanoviště	50 ml /10 litrů vody
	pravidelný postřik v intervalu 2 – 4 týdny	20 ml /10 litrů vody

